



The Effect of a Water Exercise Course on Body Composition and Quality of Life of Overweight Elderly Men

Mohsen Yaghoubi ¹, Sajjad Ramezani ^{*2}, Behnam Shamsi ³, Vahid Barfi ⁴

¹ PhD Student in Sports Physiology, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Lorestan, Khorramabad, Iran

² Instructor, Department of Physical Education and Sports Science, Faculty of Sports Sciences, Arak University, Arak, Iran

³ PhD Student in Sports Physiology, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Mahallat, Iran

⁴ Master of Sports Physiology, Faculty of Literature and Humanities, Qom University, Qom, Iran

Received: 27 August 2021 Accepted: 27 November 2021

Abstract

Background and Aim: Old age is always associated with inactivity, obesity and many physical, mental and psychological problems. The aim of this study was to determine the effect of 8 weeks of aerobic exercise in water on body composition and quality of life of overweight elderly men.

Methods: In this quasi-experimental study, 34 elderly (mean age: 66 ± 4 years old) and overweight ($BMI \geq 25$ kg/m²) men were randomly selected and randomly divided into two groups of water training (n=17) and control (n=17). The exercise program included aerobic exercise in water with an intensity of 45 to 65% of maximum heart rate for 8 weeks. At the beginning and end of the training period, body composition indicators as well as the quality of life of the elderly were evaluated according to the questionnaire of The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF).

Results: Exercise in water significantly reduced fat percentage ($P \leq 0.03$), weight ($P \leq 0.01$), body mass index ($P \leq 0.01$) and waist to hip ratio ($P \leq 0.001$) in overweight elderly men. These exercises also significantly increased the quality of life ($P \leq 0.01$). In addition to the overall quality of life score, its sub-components including physical health ($P \leq 0.05$), mental health ($P \leq 0.03$), social relations ($P \leq 0.00$) and environmental health ($P \leq 0.01$) were also improved.

Conclusion: 8 weeks of aerobic exercise in water can improve anthropometric parameters, increase quality of life and physical health in overweight elderly men. Therefore, these exercises can be recommended by sports and health experts to these people.

Keywords: Aqua Exercise, Body Composition, Quality of life, Elderly.

*Corresponding author: Sajjad Ramezani, Email: sajjad_ramezani@yahoo.com

Address: Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran

اثر یک دوره تمرین در آب بر ترکیب بدنی و کیفیت زندگی مردان سالمند دارای اضافه وزن

محسن یعقوبی^۱، سجاد رمضانی^{۲*}، بهنام شمسی^۳، وحید برفی^۴

^۱ دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

^۲ مریض گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

^۳ دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

^۴ کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

چکیده

زمینه و هدف: دوره سالمندی همواره با بی تحرکی، چاقی و بسیاری از امراض و مشکلات جسمانی، روحی و روانی همراه است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر ۸ هفته تمرین هوایی در آب بر ترکیب بدنی و کیفیت زندگی مردان سالمند دارای اضافه وزن بود.

روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی ۳۴ مرد با میانگین سنی ۶۶±۴ سال دارای اضافه وزن ($BMI \geq 25 \text{ Kg/m}^2$) به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرین در آب (۱۷ نفر) و کنترل (۱۷ نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوایی در آب با شدت ۴۵ تا ۶۵ درصد ضربان قلب بیشینه به مدت ۸ هفته بود. در ابتدا و انتهای دوره تمرینی، شاخص‌های ترکیب بدنی و همچنین کیفیت زندگی سالمنان با توجه به پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- The World Health Organization Quality of Life) (BREF) بررسی و اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: تمرین در آب باعث کاهش معنادار درصد چربی ($P \leq 0.01$)، وزن ($P \leq 0.01$)، شاخص توده بدنی ($P \leq 0.01$) و نسبت دور کمر به لگن ($P \leq 0.001$) در مردان سالمند دارای اضافه وزن شد. همچنین این تمرینات باعث افزایش معنی‌دار کیفیت زندگی در مردان سالمند گردید ($P \leq 0.01$). بطوریکه علاوه بر امتیاز کلی کیفیت زندگی، زیرمولفه‌های آن شامل سلامت جسمانی ($P \leq 0.05$)، سلامت روانی ($P \leq 0.03$)، روابط اجتماعی ($P \leq 0.00$) و سلامت محیط ($P \leq 0.01$) نیز بهبود یافت.

نتیجه‌گیری: ۸ هفته تمرین هوایی در آب می‌تواند ضمن بهبود شاخص‌های آنتروپومتریکی، باعث افزایش کیفیت زندگی و سلامت جسمانی در مردان سالمند دارای اضافه وزن شود. بنابراین این تمرینات می‌تواند جهت توصیه تمرینی توسط متخصصان ورزش و سلامت در این افراد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: تمرین در آب، ترکیب بدنی، کیفیت زندگی، سالمند.

کمک کند و راهی برای ارتباط با خانواده باشد و برای سلامت روان آنها مفید واقع شود که کاهش خطر ابتلا به افسردگی، نقص شناختی (cognitive impairment) تأخیر در بروز زوال عقل و بهبود احساسات کلی بهخصوص در سالمندان را به همراه دارد (۱۲). مطالعات پیشین مزایای و پیوشه فعالیت بدنی از جمله بهبود پارامترهای سلامت جسمی، فیزیولوژیکی و حتی پیامدهای مثبت سلامت روانی و بهزیستی را نشان داده اند (۱۳).

با این حال انجام فعالیتهای بدنی به علت برخی مسائل روانی و بدنی دوران سالمندی، بهویشه افرادی که از بیماری هایی مانند درد مفاصل و ناتوانی حرکتی رنج می برند و دارای محدودیت هایی هستند، دشوار است (۱۴، ۱۵). یکی از روش های جایگزین مناسب برای بهبود کنترل تعادل، ورزش در آب است که به دلیل خاصیت شناوری که دارد باعث کاهش وزن شده، در نتیجه این اجازه را به سالمندان می دهد تا در یک محیط بدون درد، تمرین یا فعالیت بدنی را انجام دهند (۱۶). مطالعات نشان داده اند محیط آب به دلایل شناوری، غوطه وری (۱۶)، کاهش فشار مفصلی در زمان فعالیت و بهبود تعادل می تواند محلی نسبتاً مؤثر برای تمرینات ورزشی بهخصوص برای سالمندان باشد (۱۷). به طوری که عباسی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند هشت هفته تمرین در آب باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی، بهبود شاخص توده بدنی و همچنین شاخص های قلبی عروقی در زنان میانسال می شود (۱۸). Kantyka و همکاران تأثیر ورزش های هوایی آبی را بر ترکیب بدنی زنان میانسال کم تحرک مورد بررسی قرار داده و کاهش معنادار درصد چربی بدن را گزارش کردند (۱۹). با این حال در پژوهش Pawelczyk و همکاران، سه ماه ورزش در آب تأثیر معنی داری بر کیفیت زندگی و شاخص توده بدنی و درصد چربی در زنان گزارش نشد (۲۰). همچنین Martínez و همکاران تأثیر ورزش های هوایی آبی را بر ترکیب بدنی زنان میانسال کم تحرک مورد بررسی قرار داده و کاهش معنی دار درصد چربی بدن و عدم تغییر معنی دار توده بدنی را گزارش کردند (۲۱). هر چند در مطالعه Lim و همکاران، علیرغم بهبود معنی دار کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به استئوآرتیت زانو، مقدار شاخص های ترکیب بدنی مانند BMI، وزن و درصد چربی بدن کاهش معنی داری نداشت (۲۲). با این تفاسیر به نظر می رسد شرایط محیطی آب برای سالمندان باعث بهبود کنترل وضعیت بدن شده و به آنان اجازه می دهد تا دامنه وسیعی از حرکات را بدون افزایش خطر افتادن یا آسیب انجام دهند و از طرفی توجه به بحث سلامت سالمندان و مراقبت های پیشگیرانه به منظور کاهش صدمات واردہ به دلیل افزایش سن امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، چرا که توجه به نیازهای جسمانی و عملکردی در سالمندان ضمن کاهش هزینه های درمانی برای کشورها می تواند باعث کاهش مرگ و میر زودرس و حفظ توانمندی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان شود. لذا با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و سلامت سالمندان و نیز اثرات

مقدمه

در دهه های اخیر به علت کاهش موالید، ارتقاء سلامت و افزایش امید به زندگی، جمعیت افراد سالمند افزایش یافته است (۱). خستگی، عدم اجرای مهارت های حرکتی، کاهش سازگاری افراد با محیط و همچنین تشید وابستگی به دیگران از عوامل دوره سالمندی است که علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف برای ایشان، تبعات مختلف روانی، اجتماعی و فرهنگی برای خانواده ها و جوامع ایجاد کرده است (۲). به طوری که مطالعات نشان می دهد در حدود ۶۰ درصد از هزینه های مراقبت های بهداشتی ۳۵ درصد از ترخصی های بیمارستانی و ۴۷ درصد از روزهای بستری در بیمارستان ها را افراد سالمند تشکیل می دهند (۳). نکته قابل توجه این است که با افزایش سن؛ میزان تحرک و فعالیت بدنی افراد به دلیل مشکلات ناشی از ضعف عضلانی، تعادل ضعیف و ترس از افتادن کاهش می یابد (۴). بطوری که شیوع بیماری های زمینه ای بهخصوص بیماری های قلبی و عروقی، فشارخون بالا به شدت با عدم تحرک و کاهش فعالیت جسمانی افراد ارتباط دارد (۵). مطالعات به خوبی نشان داده اند کاهش فعالیت های بدنی به دلیل افزایش سن، ضمن تغییر شکل ظاهری افراد، باعث تجمع چربی در نواحی مختلف بدن و ایجاد چاقی، بهخصوص چاقی شکمی در افراد سالمند می شود (۶). چاقی شکمی و اهمیت مطالعه آن زمانی باز ری شود که بدانیم چاقی شکمی به مراتب خطرناک تراز تجمع چربی در نقاط دیگر بدن است و خطر مرگ زودرس، بیماری های عروق مانند پرفشاری خون، هیپرلیپیدمی، دیابت، بیماری های کرونر، بیماری های تنفسی، افزایش چسبندگی خون و افسردگی و مشکلات استخوانی را به همراه دارد و این در حالی است که امروزه میزان شیوع چاقی شکمی در جوامع رو به افزایش است (۷). مطالعات اخیر نیز وجود ارتباط بین شاخص های تن سنجی همچون درصد چربی، نسبت دور کمر (WHR) و شاخص توده بدنی (BMI) با شاخص های مرتبط با سندرم متابولیک (LDL، HDL) و TG و فشارخون در افراد مورد مطالعه را نشان می دهد (۷).

از سویی دیگر استمرار خانه نشینی ناشی از بی تحرکی در سالمندان، ضمن تضعیف سریع تر و شدیدتر سیستم عضلانی اسکلتی (سارکوپنیا) و کاهش استقلال آنها، منجر به بروز مشکلات روحی و روانی در این قشر خواهد شد (۴) به طوری که ادامه این فرآیند می تواند ضمن افزایش افسردگی و کاهش کیفیت زندگی سالمندان، باعث تضعیف سیستم اینمی بدن شده و زمینه ابتلا به بیماری و حتی مرگ را سرعت بخشد (۸). بر این اساس به نظر می رسد ورزش و فعالیت بدنی به عنوان یکی از شیوه های زندگی سالم در کاهش خطر بیماری و مرگ و میر ناشی از آن مفید باشد (۹، ۱۰)، علاوه بر این اثرات مفید و مؤثر فعالیت های ورزشی بر سیستم های مختلف بدن از جمله قلب و عروق، سیستم عصبی، سیستم متابولیکی در مطالعات مختلف مشاهده شده است (۱۱). همچنین فعالیت بدنی منظم می تواند به از بین بردن روزمرگی افراد

افزایش تدریجی در شدت تمرین بود. بدین منظور در طول ۸ هفته دوره تمرینی همچنان که به اواخر دوره تمرینات نزدیک می‌شد شدت فعالیت ورزشی افزایش می‌یافت. به منظور کنترل متغیر شدت تمرین، از حداکثر ضربان قلب و برای به دست آوردن حداکثر ضربان قلب آزمودنی‌ها از معادله (سن - ۲۲۰) استفاده شد. در طول دوره تمرینات، ضربان قلب از ۴۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه شروع شد و در پایان تمرینات به ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه افزایش یافت، به طوری که تعداد جلسات تمرین در سه هفته اول ۳ جلسه در هفته با شدت ۴۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه بود که در سه هفته دوم به ۴ جلسه با شدت ۵۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه و در دو هفته سوم به ۵ جلسه در هفته با شدت ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه افزایش یافت (۱۶). همچنین این پروتکل تمرینی با توجه به توصیه‌های ویژه کالج آمریکایی طب ورزشی (ACSM) برای سالمدان اجرا شد (۲۳). به منظور کنترل شدت تمرینات، ضربان قلب شرکت کنندگان در طول هر جلسه تمرینی و در چند مرحله قبل، اواسط و بعد از تمرینات هوایی و یک بار نیز در زمان سرد کردن از شریان کاروتید اندازه‌گیری شد.

تجزیه و تحلیل اماری داده‌ها

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۲۲ و از آزمون شاپیرو-ولیک برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. پس از تأیید فرض نرمال بودن توزیع داده‌ها، از آزمون t همبسته برای مقایسه نتایج درون‌گروهی و از آزمون t مستقل برای بررسی نتایج بین گروهی در سطح معناداری ($P \leq 0.05$) استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی

مطالعه حاضر با رعایت اصول معاهده هلсинکی انجام گردید. حضور افراد داوطلبانه و اختیاری بود و از همه رضایت آگاهانه و کتبی اخذ شد. اطلاعات شخصی افراد محرمانه ماند.

نتایج

هشت هفته تمرین هوایی منتخب در آب باعث کاهش معنی‌دار درصد چربی ($P \leq 0.03$), شاخص توده بدنی ($P \leq 0.00$) و وزن ($P \leq 0.01$) و نسبت دور کمر به لگن (WHR) ($P \leq 0.01$) مردان سالمند دارای اضافه وزن شد. همچنین این نوع تمرینات باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی در مردان سالمند شد ($P \leq 0.01$). به طوری که علاوه بر امتیاز کلی کیفیت زندگی، زیرمولفه‌های آن شامل سلامت جسمانی ($P \leq 0.05$), سلامت روانی ($P \leq 0.03$), روابط اجتماعی ($P \leq 0.00$) و سلامت محیط ($P \leq 0.01$) نیز به صورت معنادار افزایش یافت (جدول ۱).

ورزش‌های آبی در سالمدان، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر هشت هفته تمرین هوایی در آب بر ترکیب بدنی و کیفیت زندگی مردان سالمند دارای اضافه وزن انجام شد.

روش‌ها

مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی بود و جامعه آماری آن را مردان سالمند دارای اضافه وزن و کم تحرک شهر اراک (میانگین سن ۱۸/۸ ± ۴/۱ سال، قد ۱۷۱ ± ۴/۳ سانتی‌متر، وزن ۸۵/۸ ± ۹/۲ کیلوگرم و شاخص توده بدنی ۲۷/۹ ± ۲/۴ Kg/m²) تشکیل می‌دادند. از بین افراد داوطلب ۳۴ نفر جهت شرکت در پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ورزش در آب (۱۷ نفر) و گروه کنترل (۱۷ نفر) قرار گرفتند. از معیارهای ورود به پژوهش عدم فعالیت ورزشی منظم و شاخص توده بدنی (BMI) بالای ۲۵ بود. قبل از انتخاب آزمودنی‌ها، افرادی که بیماری‌های شناخته شده جسمی مانند بیماری‌های قلبی عروقی، پرسشار خونی، دیابت، ورزش حرفاًی، استعمال سیگار، رژیم‌های غذایی کاهش وزن داشتند از مطالعه حذف شدند. در این تحقیق کیفیت زندگی با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (دارای روابی و پایابی با آلفای کرونباخ برای سلامت جسمی: ۰/۸)، برای سلامت روانشناختی: ۰/۷۶، برای سلامت اجتماعی: ۰/۶۶، برای سلامت محیط: ۰/۸) سنجش شد. فشارخون سیستولی و دیاستولی با استفاده فشارسنج جیوه‌ای ارکا ۳۰۰۰ ساخت کشور آلمان و قد و دور کمر و لگن با متر نواری، درصد چربی آنها با استفاده از چربی‌سنج (کالیپر) هارپندن Harpenden و توسط معادله سه نقطه‌ای جکسون-پولاک Jackson-Pollack در مرحله پایه و بعد از ۸ هفته در هر دو گروه اندازه‌گیری و همچنین شاخص توده بدنی (BMI) آنها محاسبه شد.

پروتکل تمرینی

در پژوهش حاضر تمامی مراحل تمرینی برای گروه تجربی در استخر و در منطقه کم عمق آب انجام گرفت. مدت زمان برنامه تمرینی در هر جلسه یک ساعت بود. هر جلسه تمرین در آب سه مرحله داشت: مرحله اول، تطابق با محیط آب و گرم کردن (۱۵ دقیقه) شامل حرکات کششی در تمامی مفاصل و گروههای عمدۀ عضلانی، راه رفتن به جلو، عقب، طرفین، روی پاشنه و پنجه و جاگینگ در آب بود. مرحله دوم، مرحله انجام تمرینات (۳۰ دقیقه) شامل انتقال وزن از جلو به عقب، راه رفتن سریع در آب، راه رفتن به پهلو، تقلید حرکت شوت توب فوتیال، تقلید پرتات توب با دست از مقابل بدن، دور و نزدیک کردن پاها و دستها از محور میانی بدن در حالت ایستاده و اسکات بود. مرحله سوم، انجام حرکات کششی، تنفس عمیق و تمرینات شناوری (۱۵ دقیقه) بود. این تمرینات در استخر سریوشیده با دمای آب بین ۲۶ الی ۲۸ درجه سانتی‌گراد انجام گرفت (۱۶). پروتکل تمرین در آب به صورت

جدول ۱. مقایسه عوامل تن سنجی و شاخص‌های خطرزای قلبی و عروقی در گروه‌های مورد مطالعه، (مقادیر بر اساس $M \pm SD$ بیان شده است)

P value	مرحله	گروه	شاخص‌ها	متغیرها
	قبل تمرین	بعد تمرین		
*** ۰/۰۳۰	۲۷/۸۳ ± ۳/۷۸	۳۰/۰۸ ± ۴/۰۰	تمرين در آب	آنتروپومتریکی درصد چربی
۰/۵۵۶	۲۹/۹۱ ± ۳/۱۵	۳۰/۲۰ ± ۳/۱۲	کنترل	
*** ۰/۰۱۰	۸۱/۴۱ ± ۱۰/۱۲	۸۵/۵۸ ± ۸/۲۴	تمرين در آب	وزن (کیلوگرم)
۰/۱۶۹	۸۷/۰۳ ± ۱۲/۰۷	۸۶/۰۲ ± ۱۰/۱۴	کنترل	
*** ۰/۰۰۰	۲۵/۷۶ ± ۲/۹۷	۲۷/۹۱ ± ۲/۵۸	تمرين در آب	BMI (وزن / مجذور قد)
۰/۵۵۵	۲۸/۲۵ ± ۳/۴۵	۲۸/۰۰ ± ۲/۱۷	کنترل	
*** ۰/۰۰۱	۰/۹۶ ± ۰/۰۹	۱/۲۰ ± ۰/۰۷	تمرين در آب	نسبت دور کمر به دور لگن (WHR)
۰/۲۸۴	۱/۲۸ ± ۰/۰۱	۱/۳۵ ± ۰/۰۳	کنترل	
** ۰/۰۱	۸۳/۱۰ ± ۹/۳	۷۶/۲۵ ± ۷/۹	تمرين در آب	کیفیت زندگی
۰/۲۰۳	۷۵/۲۵ ± ۱۲/۹	۷۵/۱۲ ± ۸/۱۱	کنترل	
* ۰/۰۰۵	۸۰/۸۵ ± ۹/۸۷	۷۵/۰۵ ± ۱۱/۲۰	تمرين در آب	سلامت جسمانی
۰/۱۱۴	۷۵/۸۱ ± ۱۴/۰۸	۷۵/۵۸ ± ۷/۲۰	کنترل	
*** ۰/۰۳	۸۱ ± ۱۶/۰۴	۷۵/۶۱ ± ۱۷/۲۵	تمرين در آب	سلامت روانی
۰/۲۴۹	۷۶/۶۱ ± ۹/۱۴	۷۶/۰۳ ± ۵/۱۲	کنترل	
*** ۰/۰۰	۸۶/۶۵ ± ۱۱/۲	۷۴/۴۰ ± ۱۳/۶	تمرين در آب	روابط اجتماعی
۰/۵۵۹	۷۶/۶۴ ± ۱۰/۶	۷۵/۰۶ ± ۱۵/۶	کنترل	
** ۰/۰۱	۸۲/۰۸ ± ۶/۷	۷۶/۰۴ ± ۷/۹	تمرين در آب	سلامت محیط
۰/۳۰۵	۷۵/۴۹ ± ۱۶/۱۲	۷۶/۲۵ ± ۱۱/۰۳	کنترل	

* نشان دهنده وجود اختلاف معنادار ($P \leq 0/05$) ** نشان دهنده وجود اختلاف معنادار ($P \leq 0/01$) *** نشان دهنده وجود اختلاف معنادار ($P \leq 0/001$)

بهبود معنی‌دار کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به استئوآرتیزیت زانو، مقدار شاخص‌های ترکیب بدنی همانند شاخص توده بدنی کاهش معنی‌داری نداشت (۲۲). همچنین در پژوهش Martínez و همکاران سه ماه ورزش در آب تأثیر معنی‌داری بر شاخص توده بدنی و درصد چربی در زنان نشان نداد (۲۱). به نظر می‌رسد میزان سن آزمودنی‌ها، نوع پروتکل تمرینی، شدت تمرین و جنسیت افراد شرکت‌کننده از دلایل تفاوت یافته‌های این مطالعات با نتایج مطالعه حاضر می‌باشد. از دلایل بهبود شاخص توده بدنی می‌توان به کاهش درصد چربی و افزایش توده عضلانی آزمودنی‌ها اشاره کرد. فعالیت بدنی در آب به دلیل خاصیت مقاومتی آب نوعی شرایط تمرینی مقاومتی ایجاد می‌کند که می‌تواند در افزایش هیپرتروفی عضلانی و همچنین افزایش بافت عضلانی موثر باشد (۱۹). علاوه بر این بر اساس مطالعات انجام گرفته تمریناتی که به صورت هوایی و به شکل منظم و کنترل شده در افراد بزرگسال انجام گیرد، بیشتر و بهتر می‌تواند سبب کاهش وزن، توده چربی و آدیپوسایتوکائین‌ها و فاکتورهای التهابی شود (۲۵). در حالی که در طولانی مدت اثر ضدالتهابی داشته و با کاهش در توده چربی، احتمال ابتلا به مقاومت انسولینی را کاهش می‌دهد (۲۶). از سوی دیگر افزایش جریان خون بافت چربی و همچنین افزایش فعالیت لیپاز حساس به هورمون نیز می‌تواند در کاهش مقدار چربی زیر پوستی و بهبود ترکیب بدنی موثر باشد. این عمل منجر به بیشتر شدن مصرف

بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ۸ هفته تمرین هوایی منتخب در آب باعث کاهش معنی‌دار درصد چربی، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به لگن می‌شود. Kantyka و همکاران در مطالعه‌ای تأثیر ورزش‌های هوایی آبی را بر ترکیب بدنی زنان میانسال کم تحرک مورد بررسی قرار داده و کاهش معنی‌دار درصد چربی بدن و عدم تغییر معنی‌دار شاخص توده بدنی را گزارش کردند (۱۹). Bergamin و همکاران تأثیر ۲۴ هفته تمرین در آب گرم بر شاخص‌های توده بدنی و عملکرد فیزیولوژیکی در افراد سالمند را بررسی کردند و به یافته‌های مشابهی در همین زمینه دست یافتند (۲۴). همانطور که بیان شد، تمام آزمودنی‌های مورد مطالعه در تحقیقات ارائه شده، به دلایل مختلف همچون وزن بالا، شرایط سمنی و عدم تعادل کافی، دردهای مفصلی و ... قادر به انجام بسیاری از فعالیتها و تمرینات ورزشی نبوده‌اند و از نظر جسمانی کم تحرک یا غیرفعال می‌باشند، لذا به دلیل مزایای فیزیکی که در محیط آب ایجاد می‌شود، این اجازه را به سالمدان می‌دهد تا در یک محیط بدون درد، تمرین یا فعالیت بدنی را بصورت کامل انجام دهند و شروع هر نوع فعالیت ورزشی و فیزیکی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن باعث ایجاد تغییرات آنتروپومتریکی و کاهش سریع توده چربی به خصوص چربی‌های محیطی شود (۱۶). هر چند در مطالعه Lim و همکاران علیرغم

به خصوص جنبه‌های روحی و روانی آنها داشته باشد و منجر به ارتقای احساس رضایت آنان از زندگی شود (۲۸). در مطالعه حاضر نیز به دلیل اثرات سودمند تمرینات در آب بر خصوص بر ابقاء قدرت عضلانی، به نظر می‌رسد این نوع تمرینات ضمن افزایش قدرت عضلانی سالمندان باعث بهبود کنترل وضعیت بدنی در آنها شده (۳۲) و به آنان اجازه می‌دهد تا دامنه وسیعی از حرکات را بدون افزایش خطر افتادن یا آسیب انجام دهند به طوری که حتی تقویت عضلانی می‌تواند ضمن کاهش فشار مکانیکی بر روی مفاصل از میزان دردهای مفصلی بکاهد (۳۲). بر این اساس تمرینات در آب می‌تواند ضمن بهبود زیرمولفه سلامت جسمانی بر سایر زیرمولفه‌های کیفیت زندگی موثر باشد. با این حال در اجرای مطالعه حاضر محققین همواره با محدودیت‌ها و مشکلاتی روبرو بودند که از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به کنترل نکردن کامل رژیم غذایی آزمودنی‌ها، کنترل نکردن هیجان و اضطراب آزمودنی‌ها، تفاوت‌های فردی از نظر خصوصیات ژنتیکی و ویژگی‌های وراثتی آنها در اندازه‌گیری برخی شاخص‌ها، تفاوت فردی آزمودنی‌ها از نظر وضعیت روحی و روانی در جلسات تمرین اشاره کرد.

نتیجه‌گیری

افراد سالمند می‌توانند بدون هر نوع اضطراب و تنفسی، تمرینات ورزشی در آب را انجام دهند و بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر به نظر می‌رسد اجرای هشت هفته تمرینات هوایی در آب توانسته است شاخص‌های آنtrapوپوتیکی افراد سالمند دارای اضافه وزن را بهبود بخشد، که این عامل با ارتقای کیفیت زندگی ایشان همراه بوده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود متخصصین ورزش و سلامت در ارائه پروتکل‌های تمرینی در حوزه سالمندی، فعالیت و تمرینات در آب را مورد توجه قرار دهند.

تشکر و قدردانی: از همه استادی که در غنای مطالب حاضر یاری رسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

نقش نویسندها: ارائه ایده و طرح اولیه: یعقوبی، سجاد رمضانی. جمع‌آوری داده‌ها: یعقوبی، رمضانی، شمسی. تکمیل پرسشنامه‌ها: رمضانی، شمسی، برفی. معاینه بیمار: یعقوبی، رمضانی. تحلیل و تفسیر داده‌ها: یعقوبی، رمضانی، برفی. همه نویسندها در نگارش اولیه مقاله یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می‌پذیرند.

تضاد منافع: نویسندها تصویر می‌کنند که هیچ گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.

چربی‌های ذخیره‌ای و متعاقب آن کاهش درصد چربی و بهبود ترکیب بدنی می‌شود (۲۷).

نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد، ۸ هفته تمرین هوایی در آب باعث افزایش معنی‌دار کیفیت زندگی مردان سالمند دارای اضافه وزن می‌شود. در همین راستا احمدی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که زنان سالمندی که فعالیت بدنی منظم داشتند، کیفیت زندگی بالاتری نسبت به زنان سالمند غیرفعال داشتند و زنان سالمند فعل در مقایسه با زنان سالمند غیرفعال در مولفه‌های، سلامت عاطفی، انرژی و سرزنشگی، سلامت روانی، درد و سلامت عمومی اختلاف معناداری داشتند (۲۸). همچنین در مطالعه دیگری تأثیر برنامه ورزشی بر کیفیت زندگی سالمندان شهرکرد بررسی شد، محققین گزارش کردند که برنامه تمرینی ارائه شده موجب بهبود سلامت جسمانی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی سالمندان می‌گردد (۲۹). سایر تحقیقاتی که به بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی افراد پرداخته‌اند نیز نشان داده‌اند افرادی که برنامه تمرینی منظمی دارند در مقایسه با افراد غیرفعال کمتر دچار بیماری‌های قلبی عروقی، عضلات اسکلتی، دیابت، انواع سرطان، مشکلات ریوی، چاقی و... می‌شوند (۲۸). همچنین با توجه به ارتباط بین ورزش با سایر جنبه‌ها، این افراد از نظر عاطفی قوی‌تر و دارای روحیه بالاتر و بطور کلی از نظر روانی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشتند (۲۸). شمسی‌پوردهکردی و همکاران در مطالعه‌ای بر روی کیفیت زندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه سیزوار به این نتیجه رسیدند که آزمودنی‌های دارای فعالیت ورزشی در مقایسه با آزمودنی‌های غیرفعال مشکلات جسمی کمتری داشتند اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود (۳۰). به نظر می‌رسد با افزایش سن، نقش ورزش و فعالیت ورزشی در تأمین سلامت جسمانی پررنگ‌تر می‌شود در حالی که در مطالعه شمسی‌پوردهکردی و همکاران، شرکت کنندگان جوان بوده و از نظر جسمانی از شرایط مطلوبی برخوردار بودند.

مطالعات نشان داده‌اند که کیفیت زندگی سالمندان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند (۲۹) و عمدت‌ترین تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نگرش مردم و دولت‌ها در مواجهه با چالش‌های ناشی از دوران سالمندی و افراد سالمند است لذا بیشتر مطالعات کیفیت زندگی سالمندان در کشورهای در حال توسعه را متوسط ارزیابی کرده‌اند (۳۱). با این وجود مطالعات نشان داده‌اند که تمرینات ورزشی تغییرات عملکردی مرتبط با افزایش سن را جبران کرده است (۳۲) و تمرینات ورزشی ضمن کاهش سرعت تخریب سلول‌های ماهواره‌ای و بافت عضلانی (۳۳) با ضعف عضلانی ناشی از پیری مقابله کرده و استقلال را در سنین سالمندی به مدت طولانی‌تری حفظ می‌کند (۳۴). علاوه بر آن پرداختن به فعالیت جسمانی و ورزش می‌تواند اثرات مفیدی بر سایر ابعاد زندگی سالمند

منابع

1. Beh-Pajoh A, Soleymani S. The relationship between sleep quality and depression in older people living in 3 districts of Tehran, Iran. *Iranian Journal of Ageing*. 2016;11(4):72-9. doi:[10.21859/sija-110172](https://doi.org/10.21859/sija-110172)
2. Adsett J, Mullins R. Evidence based guidelines for exercise and chronic heart failure. Pathways home project. 2010;4:17
3. Katsura Y, Ueda S-Y, Yoshikawa T, Usui T, Orita K, Sakamoto H, et al. Effects of aquatic exercise training using new water-resistance equipment on trunk muscles, abdominal circumference, and activities of daily living in elderly women. *International Journal of Sport and Health Science*. 2011;11:12260082 doi:[10.5432/ijshs.201112](https://doi.org/10.5432/ijshs.201112)
4. yaghoubi M, ramezanii S. The Effect of Resistance Training at Home on Different Dimensions of Quality of Life, Blood Pressure and Indices of Abdominal Obesity in The Elderly During Covid -19 quarantine. *cjhaa*. 2021;5(2):70-84.
5. Sharifan P, Ziae A, Darroudi S, Rezaie M, Safarian M, Eslami S, et al. Effect of low-fat dairy products fortified with 1500IU nano encapsulated vitamin D3 on cardiometabolic indicators in adults with abdominal obesity: a total blinded randomized controlled trial. *Current Medical Research and Opinion*. 2021;37(4):579-88. doi:[10.1080/03007995.2021.1874324](https://doi.org/10.1080/03007995.2021.1874324)
6. Lee J, Stone AJ. Combined aerobic and resistance training for cardiorespiratory fitness, muscle strength, and walking capacity after stroke: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*. 2020; 29 (1): 104498. doi:[10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104498](https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104498)
7. Oda E. LDL cholesterol was more strongly associated with percent body fat than body mass index and waist circumference in a health screening population. *Obesity research & clinical practice*. 2018;12(2):195-203 doi:[10.1016/j.orcp.2017.05.005](https://doi.org/10.1016/j.orcp.2017.05.005)
8. Simpson RJ, Bigley AB, Agha N, Hanley PJ, Bolland CM. Mobilizing immune cells with exercise for cancer immunotherapy. *Exercise and sport sciences reviews*. 2017;45(3):163. doi:[10.1249/JES.0000000000000114](https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000114)
9. Manson JE, Greenland P, LaCroix AZ, Stefanick ML, Mouton CP, Oberman A, et al. Walking compared with vigorous exercise for the prevention of cardiovascular events in women. *New England journal of medicine*. 2002;347(10):716-25. doi:[10.1056/NEJMoa021067](https://doi.org/10.1056/NEJMoa021067)
10. Peake JM, Neubauer O, Walsh NP, Simpson RJ. Recovery of the immune system after exercise. *Journal of Applied Physiology*. 2017;122(5):1077-87. doi:[10.1152/japplphysiol.00622.2016](https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00622.2016)
11. Woods JA, Hutchinson NT, Powers SK, Roberts WO, Gomez-Cabrera MC, Radak Z, et al. The COVID-19 pandemic and physical activity. *Sports Medicine and Health Science*. 2020;2(2):55-64 doi:[10.1016/j.smhs.2020.05.006](https://doi.org/10.1016/j.smhs.2020.05.006)
12. Czosnek L, Lederman O, Cormie P, Zopf E, Stubbs B, Rosenbaum S. Health benefits, safety and cost of physical activity interventions for mental health conditions: A meta-review to inform translation efforts. *Mental Health and Physical Activity*. 2019;16:140-51. doi:[10.1016/j.mhpa.2018.11.001](https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2018.11.001)
13. Haible S, Volk C, Demetriou Y, Höner O, Thiel A, Sudeck G. Physical activity-related health competence, physical activity, and physical fitness: analysis of control competence for the self-directed exercise of adolescents. *International journal of environmental research and public health*. 2020; 17 (1): 39 doi:[10.3390/ijerph17010039](https://doi.org/10.3390/ijerph17010039)
14. Rezaeipour M, Apanasenko GL. Acute Improvement of Postural Steadiness Through Neuromuscular and Proprioceptive Training in Sedentary Older Females. *Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies*. 2020;7(4). doi:[10.5812/mejrh.104894](https://doi.org/10.5812/mejrh.104894)
15. Batacan Jr RB, Duncan MJ, Dalbo VJ, Buitrago GL, Fenning AS. Effect of different intensities of physical activity on cardiometabolic markers and vascular and cardiac function in adult rats fed with a high-fat high-carbohydrate diet. *Journal of sport and health science*. 2018;7(1):109-19 doi:[10.1016/j.jshs.2016.08.001](https://doi.org/10.1016/j.jshs.2016.08.001)
16. Simas V, Hing W, Pope R, Climstein M. Effects of water-based exercise on bone health of middle-aged and older adults: a systematic review and meta-analysis. *Open access journal of sports medicine*. 2017; 8:39. doi:[10.2147/OAJSM.S129182](https://doi.org/10.2147/OAJSM.S129182)
17. Roth AE, Miller MG, Ricard M, Ritenour D, Chapman BL. Comparisons of static and dynamic balance following training in aquatic and land environments. *Journal of Sport Rehabilitation*. 2006; 15 (4):299-311.. doi:[10.1123/jsr.15.4.299](https://doi.org/10.1123/jsr.15.4.299)
18. Abbasi M, Mojtabaei H. The Effect of Aquatic Exercise on Quality of Life, Body Mass index and cardiovascular Markers in Middle-aged Women: a pilot study. *Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences*. 2017;5(1):50-6
19. Kantyka J, Herman D, Rocznik R, Kuba L. Effects of aqua aerobics on body composition, body mass, lipid profile, and blood count in middle-aged sedentary women. *Human Movement*. 2015;16(1):9-14. doi:[10.1515/humo-2015-0020](https://doi.org/10.1515/humo-2015-0020)
20. Pawelczyk M, Kaczorowska B, Baj Z. Fibrinogen concentrations in ischaemic stroke patients with metabolic disorders. *Neurologia i neurochirurgia polska*. 2020;54(3):259-64.. doi:[10.5603/PJNNS.a2020.0035](https://doi.org/10.5603/PJNNS.a2020.0035)
21. Ochoa Martínez PY, Hall López JA, Alarcón Meza EI, Piña Díaz D, Estélio Henrique MD. Efecto de Tres Meses de un Programa de Ejercicio Acuático en la Composición Corporal de Adultas Mayores. *International Journal of Morphology*. 2014; 32 (4): 1248-53. doi:[10.4067/S0717-95022014000400020](https://doi.org/10.4067/S0717-95022014000400020)
22. Lim J-Y, Tchai E, Jang S-N. Effectiveness of aquatic exercise for obese patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. *Pm & r*. 2010; 2(8):723-31. doi:[10.1016/j.pmrj.2010.04.004](https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2010.04.004)

23. Chodzko-Zajko WJ, Proctor DN, Singh MAF, Minson CT, Nigg CR, Salem GJ, et al. Exercise and physical activity for older adults. *Medicine & science in sports & exercise.* 2009;41(7):1510-30. doi:10.1249/MSS.0b013e3181a0c95c
24. Bergamin M, Ermolao A, Tolomio S, Berton L, Sergi G, Zaccaria M. Water-versus land-based exercise in elderly subjects: effects on physical performance and body composition. *Clinical interventions in aging.* 2013;8:1109. doi:10.2147/CIA.S44198
25. KhajehLandi M, Bolboli L, Bolbol S, Zabihi B. Effect of One Course Pilates Exercise Program on Serum Levels of Resistin, Visfatin, and Chemerin in Overweight Women. *The Horizon of Medical Sciences.* 2020;27(1):93-113. doi:10.32598/hms.27.1.3004.1
26. Al Khalifah R, Suppère C, Haidar A, Rabasa-Lhoret R, Ladouceur M, Legault L. Association of aerobic fitness level with exercise-induced hypoglycaemia in Type 1 diabetes. *Diabetic Medicine.* 2016;33(12):1686-90. doi:10.1111/dme.13070
27. Kushkestani M, Parvani M, Nosrani SEP, Rezaei S. The Relationship between Anthropometric Indices and Lipid Profiles In-OfficeEmployees. *Journal of Sports Science.* 2020;8:76-82. doi:10.17265/2332-7839/2020.02.006
28. Ahmadi M, Noudehi M, Esmaeili M, Sadollahi A. Comparing the quality of life between active and non-active elderly women with an emphasis on physical activity. *Iranian Journal of Ageing.* 2017; 12 (3): 262-75. doi:10.21859/sija.12.3.262
29. Madmoli M, Madmoli Y, Rahmati P, Adavi A, Yousefi N, Gheisari Z, et al. Quality of life and some related factors in patients with beta thalassemia major in Southwest Iran. *Journal of Client-Centered Nursing Care.* 2017;3(2):139-46. doi:10.32598/jccnc.3.2.139
30. Shamsipour D, Abdoli B, Modaberi S. Effectiveness of physical activity on quality of life of elderly patients with osteoarthritis. 2012.
31. Feyisa BR, Yilma MT, Tolessa BE. Predictors of health-related quality of life among patients with diabetes on follow-up at Nekemte specialised Hospital, Western Ethiopia: a cross-sectional study. *BMJ open.* 2020;10(7):e036106. doi:10.1136/bmjopen-2019-036106
32. Zareiy H, Norasteh A, Koohboomi M, Rasht I. Effect of Combined Training (Strength and Stretching) on Balance, Risk of Falling, and Quality of Life in the Elderly. *J Rehab Med.* 2018;7(2):201-8. doi:10.22037/JRM.2017.110651.1433
33. Mukund K, Subramaniam S. Skeletal muscle: A review of molecular structure and function, in health and disease. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine.* 2020;12(1):e1462 doi:10.1002/wsbm.1462
34. Moreira NB, da Silva LP, Rodacki ALF. Aquatic exercise improves functional capacity, perceptual aspects, and quality of life in older adults with musculoskeletal disorders and risk of falling: A randomized controlled trial. *Experimental gerontology.* 2020;142:111135. doi:10.1016/j.exger.2020.111135